Vaxneuvance®
Vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (15 - valente, adsorbida)

MSD

VAXNEUVANCE® está indicada para la inmunización activa para la prevención de enfermedades invasivas, neumonías y otitis media aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* en lactantes, niños y adolescentes desde las 6 semanas hasta los 18 años de edad[1].

VAXNEUVANCE® contiene 15 serotipos de *S. pneumoniae*[1,3]



VAXNEUVANCE® ha sido estudiada en una amplia variedad de poblaciones pediátricas[1]

Más de 7000 lactantes y niños fueron inscritos en estudios clínicos[1]

- Lactantes y niños sanos[1]
- Niños con anemia falciforme[1]
- Prematuros[1,a]
- Niños con VIH[1,b]
- Receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas[1,2,c]

[a]Menos de 37 semanas de gestación al nacer. [b]Este estudio incluyó niños de 6 a 18 años con recuento de células T CD4+ <500 células por microlitro y un valor de ARN del VIH en plasma < 50.000 copias/mL. [c]Este estudio se realizó en sujetos pediátricos (n=14) y adultos (n=260).

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Considere administrar VAXNEUVANCE® a sus pacientes pediátricos o intercambiar pauta con VNC13 en cualquiera de las dosis[1].

VAXNEUVANCE® puede administrarse:

Como parte de un programa de rescate[1,d].

En concomitancia con otras vacunas pediátricas[1,e].

[d] Para pacientes que no se han vacunado o que completaron la vacunación con una PCV de menor valencia (de 7 meses a 18 años). [e] En lactantes y niños de 6 semanas a 2 años de edad, incluyendo las vacunas frente a difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis (serotipos 1, 2 y 3), hepatitis A, hepatitis B, *Haemophilus influenzae* tipo b, sarampión, paperas, rubeola, varicela y rotavirus, ya sea como vacunas monovalentes o combinadas.

Esquema de dosificación de VAXNEUVANCE® para lactantes y niños[1]:

Pauta de inmunización recomendada en España[1]

REGIMEN DE 3 DOSIS

DOSIS 1:	DOSIS 2:	DOSIS 3:
A partir de las 6 semanas de edad	8 semanas después	11-15 meses de edad

Abreviaturas:
ENI: enfermedad neumocócica invasiva, **VNC:** vacuna antineumocócica conjugada, **VNC13:** vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, **VIH:** virus de la inmunodeficiencia humana, **ARN:** ácido ribonucleico.

Referencias:
1. Ficha técnica Vaxneuvance®. **2.** Wilck M, Cornely OA, Cordonnier C, Velez JD, Ljungman P, Maertens J, et al. A phase 3 randomized, double-blind, comparator-controlled study to evaluate safety, tolerability andimmunogenicity of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, in allogeneic hematopoietic cell transplant recipients (PNEU-STEM). Clin Infect Dis. 2023 Oct 13;77(8):1102-1110.

Indicaciones terapéuticas:
Vaxneuvance® está indicada para la inmunización activa para la prevención de enfermedades invasivas, neumonías y otitis media aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* en lactantes, niños y adolescentes desde las 6 semanas hasta los 18 años de edad.
Vaxneuvance® está indicada para inmunización activa para la prevención de enfermedades invasivas y neumonías causadas por *Streptococcus pneumoniae* en individuos a partir de 18 años de edad.
El uso de Vaxneuvance® se debe determinar en función de las recomendaciones oficiales.

Antes de prescribir, dispensar, indicar, usar o autorizar la dispensación de Vaxneuvance ®, por favor consulte la Ficha Técnica y las recomendaciones oficiales vifentes en su Comunidad Autónoma en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/calendario/Calendario_CCAA.htm

Para información adicional de seguridad, por favor consulte la Ficha Técnica de Vaxneuvance®

Información de seguridad seleccionada de Vaxneuvance®

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensacióny prestación de Vaxneuvance®

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 42 · 28027 Madrid.
Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
Todos los derechos reservados.
ES-PVC-00075 (Creado: abril 2026)