Compromiso MSD

MSD

MSD ha desempeñado un papel decisivo en la historia de la vacunación e inmunización.



1963 — MORATEN®
Vacuna frente al sarampión*.

1967 — MUMPSVAX®
Vacuna frente a las paperas*.

1969 — MERUVAX®
Vacuna frente a la rubeola*.

1997 — VAQTA®
Vacuna frente a la hepatitis A[1].

2001 — HBVAXPRO®
Vacuna frente a la hepatitis B[2].

2003 — VARIVAX®
Vacuna frente a varicela[3].

2006 — PROQUAD®
Vacuna frente al sarampión, parotiditis, rubéola y varicela[4].

2006 — M-M-RVAXPRO®
Vacuna combinada frente al sarampión, la parotiditis y la rubeola[5].

2006 — ROTATEQ®
Vacuna oral pentavalente frente a la gastroenteritis por rotavirus causada por los serotipos G1, G2, G3, G4 y P1A[8] en lactantes y niños[6].

2006 — GARDASIL®
Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) cuadrivalente recombinante.**

2015 — PNEUMOVAX® 23
Vacuna antineumocócica polisacarídica[7].

2015 — GARDASIL®9
Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) nonavalente recombinante[8].

2016 — VAXELIS®
Vacuna frente a difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades invasivas causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib)[9].

2021 — VAXNEUVANCE®
Vacuna frente a enfermedades invasivas y neumonías causadas por *Streptococcus pneumoniae* en adultos. Posterior extensión de la indicación a población pediátrica, incluyendo otitis media[10].

2025 — ▼ CAPVAXIVE®
Vacuna frente a la enfermedad invasiva y neumonía causadas por *Streptococcus pneumoniae* en adultos. Posterior extensión de la indicación a niños y adolescentes de 2 a menos de 18 años[11].

2026 — ▼ ENFLONSIA®
Anticuerpo monoclonal frente a la infección de las vías respiratorias inferiores causada por el VRS en recién nacidos y lactantes durante su primera temporada de VRS[12].

*** Estas vacunas no han sido comercializadas en España. La mención a las mismas en este material se hace exclusivamente con el fin de ofrecer datos objetivos sobre el papel de MSD en la investigación y desarrollo de diferentes vacunas a lo largo de la historia.**

****Actualmente no comercializada en España.**

▼ **Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.**

Compromiso MSD

MSD ayuda a proteger frente a gran parte de las enfermedades contempladas en el Calendario Común de Vacunación e Inmunización a lo Largo de Toda la Vida de 2026 del Sistema Nacional de Salud:



Para más información sobre el Calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida, por favor, acceda a https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf

GARDASIL® 9

Indicaciones terapéuticas

Gardasil® 9 está indicada para la inmunización activa de individuos a partir de los 9 años de edad frente a las siguientes enfermedades por VPH:
Lesiones precancerosas y canceres que afectan al cuello de útero, vulva, vagina y ano causados por los tipos del VPH de la vacuna.
Verrugas genitales *(Condiloma acuminata)* causados por tipos específicos del VPH.
Gardasil® 9 debe usarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

PROQUAD®

Indicaciones terapéuticas

ProQuad® está indicado para la vacunación simultánea frente a sarampión, parotiditis, rubéola y varicela en individuos a partir de los 12 meses de edad.
ProQuad® se puede administrar a individuos a partir de los 9 meses de edad bajo circunstancias especiales (por ejemplo, para cumplir con los calendarios nacionales de vacunación, en situaciones de brotes o viaje a una región con alta prevalencia de sarampión).

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

CAPVAXIVE®

Indicaciones terapéuticas

CAPVAXIVE® está indicada para la inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y neumonía causadas por *Streptococcus pneumoniae* en personas a partir de 18 años de edad.
CAPVAXIVE® está indicada para la inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva y la neumonía causadas por *Streptococcus pneumoniae* en niños y adolescentes de 2 a menos de 18 años de edad que hayan completado previamente una pauta de vacunación neumocócica pediátrica primaria.
El uso de CAPVAXIVE® se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

ROTATEQ®

Indicaciones terapéuticas

RotaTeq® está indicado para la inmunización activa de niños a partir de las 6 semanas a 32 semanas de edad para la prevención de la gastroenteritis debida a infección por rotavirus.
RotaTeq® se debe utilizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

HBVAXPRO®

Indicaciones terapéuticas

HBVAXPRO® 5 µg está indicada para la inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos en individuos desde el nacimiento hasta los 15 años de edad considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B. Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO® también se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infección de hepatitis B.
HBVAXPRO® 10 µg está indicada para la inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en individuos a partir de 16 años de edad considerados en riesgo de exposición al virus de la hepatitis B Los grupos de riesgo específicos para la vacunación se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales. Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO® también se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infección de hepatitis B.
HBVAXPRO® 40 µg está indicada para la inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en pacientes adultos en prediálisis y diálisis. Se puede esperar que mediante la inmunización con HBVAXPRO® también se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infección de hepatitis B.

Ficha Técnica 5 µg

Ficha Técnica 10 µg

Ficha Técnica 40 µg

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

M-M-RVAXPRO®

Indicaciones terapéuticas

M-M-RvaxPro® está indicado para la vacunación simultánea frente a sarampión, parotiditis y rubéola en individuos desde los 12 meses de edad.
M-M-RvaxPro® se puede administrar, en circunstancias especiales, a niños desde los 9 meses de edad.
M-M-RvaxPro® debe administrarse de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

PNEUMOVAX® 23

Indicaciones terapéuticas

PNEUMOVAX® 23 está indicado para la inmunización activa frente a la enfermedad neumocócica en niños a partir de 2 años de edad, adolescentes y adultos.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

ENFLONSIA®

Indicaciones terapéuticas

ENFLONSIA® está indicado para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores producida por el virus respiratorio sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes durante su primera temporada del VRS.

ENFLONSIA® se debe utilizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

VAQTA®

Indicaciones terapéuticas

VAQTA® 25 U/0,5 ml está indicado en la profilaxis activa pre-exposición frente a la enfermedad causada por el virus de la hepatitis A. VAQTA® 25 U/0,5 ml se recomienda en individuos sanos entre 12 meses y 17 años de edad con riesgo de contraer o propagar la infección o que estén en riesgo de padecer una enfermedad mortal si son infectados (p.e. hepatitis C con enfermedad hepática diagnosticada).
El uso de VAQTA® se debe determinar de acuerdo a las recomendaciones oficiales.

VAQTA® 50 U/1 ml está indicado en la profilaxis activa pre-exposición frente a la enfermedad causada por el virus de la hepatitis A. VAQTA® 50 U/1 ml se recomienda en adultos sanos de edad igual o superior a 18 años con riesgo de contraer o propagar la infección o que estén en riesgo de padecer una enfermedad mortal si son infectados (p.e. personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o hepatitis C con enfermedad hepática diagnosticada).
El uso de VAQTA® se debe determinar de acuerdo a las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica 25 U/0,5 ml

Ficha Técnica 50 U/1 ml

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

VAXELIS®

Indicaciones terapéuticas

Vaxelis® (DTaP-HB-IPV-Hib) está indicada para la vacunación primaria y la vacunación de recuerdo en lactantes y en niños a partir de las seis semanas de edad, frente a difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades invasivas causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib).
El uso de Vaxelis® debe ser según las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

VARIVAX®

Indicaciones terapéuticas

VARIVAX® está indicado para la vacunación frente a varicela en individuos a partir de 12 meses de edad.

VARIVAX® se puede administrar a niños a partir de 9 meses de edad bajo circunstancias especiales, como para cumplir con los calendarios nacionales de vacunación o en situaciones de brote epidémico.

VARIVAX® también se puede administrar a individuos susceptibles que han estado expuestos a varicela. La vacunación dentro de los 3 días posteriores a la exposición puede prevenir una infección clínicamente evidente o modificar el curso de la infección. Además, existen algunos datos que indican que la vacunación hasta 5 días después de la exposición puede modificar el curso de la infección.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

VAXNEUVANCE®

Indicaciones terapéuticas

Vaxneuvance® está indicada para la inmunización activa para la prevención de enfermedades invasivas, neumonías y otitis media aguda causadas por *Streptococcus pneumoniae* en lactantes, niños y adolescentes desde las 6 semanas hasta los 18 años de edad.

Vaxneuvance® está indicada para inmunización activa para la prevención de enfermedades invasivas y neumonías causadas por *Streptococcus pneumoniae* en individuos a partir de 18 años de edad.

El uso de Vaxneuvance® se debe determinar en función de las recomendaciones oficiales.

Ficha Técnica

Precios autorizados y condiciones de prescripción, dispensación y prestación

Antes de prescribir, dispensar, indicar, usar o autorizar la dispensación de CAPVAXIVE®, Gardasil® 9, ProQuad®, RotaTeq®, M-M-RvaxPro®, HBVAXPRO®, PNEUMOVAX® 23, VAQTA®, Vaxelis®, VARIVAX®, Vaxneuvance®, ENFLONSIA®, por favor consulte su Ficha Técnica y las recomendaciones oficiales vigentes en su Comunidad Autónoma.

Recomendaciones oficiales vigentes en las Comunidades Autónomas

ABREVIATURAS

VPI: Vacuna Poliomielitis inactivada
DTPa: Difteria, tétanos y tosferina acelular de alta carga
dTpa: Difteria, tétanos y tosferina acelular de baja carga
Td: Tétanos y difteria
Hib: *Haemophilus influenzae* b
HB: Hepatitis B
VNC: Vacuna antineumocócica conjugada
RV: Rotavirus
Men B: Meningococo B
Men C: Meningococo C
MenACWY: Meningococo A, C, W e Y
TV (triple vírica): Sarampión, rubéola y parotiditis
VVZ: Virus Varicela Zóster
VPH: Virus del Papiloma Humano
HZ: Herpes Zóster
VRS: Virus Respiratorio Sincitial

REFERENCIAS

1. Ficha técnica VAQTA®
2. Ficha técnica HBVAXPRO®
3. Ficha técnica VARIVAX®
4. Ficha técnica ProQuad®
5. Ficha Técnica M-M-RvaxPro®
6. Ficha técnica RotaTeq®
7. Ficha técnica PNEUMOVAX® 23
8. Ficha técnica Gardasil® 9
9. Ficha tecnica Vaxelis®
10. Ficha técnica Vaxneuvance®
11. Ficha técnica CAPVAXIVE®
12. Ficha ténica ENFLONSIA®
13. Ministerio de Sanidad. Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida 2026. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacutnaciones/calendario/docs/CalendarioVacunacion_Todalavida.pdf. Consultado en febrero de 2026.

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 42 · 28027 Madrid.

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.

ES-PVC-00078 (Creado: octubre 2026)